

# VACCINATIONS ET GROSSESSE

## FICHE DE SYNTHÈSE

**VACCINS INACTIVES** : données d'innocuité souvent insuffisantes, seulement certains autorisés durant la grossesse

**VACCINS VIVANTS ATTENUÉS** : contre-indiqués pendant la grossesse

### Cs pré conceptionnelle :

⇒ <b>Vérifier statut vaccinal</b> : <b>ROR, varicelle +++</b> et respect du calendrier vaccinal	
⇒ <b>Proposer vaccinations</b> :	
ROR	Varicelle
<i>Si sérologie rubéole négative et absence de 2 doses de vaccin antérieur ou 1<sup>ère</sup> dose faite avant l'âge de 12 mois</i>	<i>si IgG-VZV négative</i>
1 dose si née avant 1980 ; 2 doses si née après 1980: Priorix® ou M-M-RVaxpro®	2 doses de vaccins espacées de 4 à 8 semaines (Varivax®) ou de 6 à 10 semaines (Varilrix®)

### Durant la grossesse :

Vaccins recommandés	Vaccins autorisés si risque particulier	Vaccins à éviter voire contre indiqués (manque de données d'innocuité)	Vaccins toujours contre indiqués
<p><b>Coqueluche</b> Bootsrix Tetra® ; Repevax® 1dose entre 20 et 36SA</p> <p>De septembre à janvier : <b>VRS</b> Abrysvo® 1dose entre 32 et 36SA Si pas de vaccination antérieure Délai de 15j avec vaccin Coq</p> <p>D'octobre à mars <b>Grippe saisonnière</b> Vaxigrip®, Influvac Tetra®, Fluarix Tetra® 1 dose</p> <p><b>COVID</b> Comirnaty®, Spikevax® 1 dose co adm avec grippe</p>	<p><i>Si voyage :</i> Hépatite A et B, méningocoques, fièvre jaune Rage, encéphalite à tique <i>En fonction bénéfice/risque</i></p>	<p>Méningocoque, typhoïde, pneumocoque, hépatite A, encéphalite japonaise <b>= vaccins inactivés</b></p>	<p>BCG, rubéole, oreillons, rougeole, varicelle <b>= vaccins vivants atténués</b></p>
		<p><i>Une vaccination réalisée par mégarde, chez une femme enceinte ne justifie pas une interruption de la grossesse</i></p>	

### Après la grossesse :

Vaccins recommandés si non immunisée	Allaitement*	Vaccins recommandés si risque particulier
Rubéole (ROR), varicelle, coqueluche (+ cocooning)	Tous les vaccins sont autorisés à l'exception de la fièvre jaune	Pneumocoque, hépatite B, fièvre jaune*, méningocoque

**Coqueluche et cocooning si absence de vaccination en cours de grossesse**

### Pourquoi ?

Stratégie de **protection indirecte des nourrissons < 6 mois des coqueluches graves** par la vaccination de leurs proches, y compris avant même la grossesse

### Pour qui ?

Toutes personnes susceptibles d'être en contact étroit avec le nourrisson au cours des six premiers mois de vie: parents, fratrie, grands-parents, baby-sitters...) au plus tard à la naissance de l'enfant (de préférence en fin de grossesse)

# 2025

## Calendrier simplifié des vaccinations

Âge approprié	Vaccinations obligatoires pour les nourrissons										6 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	65 ans et +	
	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois							
BCG	■															
DTP et Coqueluche		■		■				■							Tous les 20 ans	Tous les 10 ans
Hib		■		■				■								
Hépatite B		■		■				■								
Pneumocoque		■		■				■								
ROR										■	■					
Méningocoques ACWY						■			■				■			
Méningocoque B			■		■			■								
Rotavirus		■	■	■												
HPV												■				
Grippe																Tous les ans
Covid-19																Tous les ans
Zona																
VRS																75 ans et +

### Tuberculose (BCG)

La vaccination contre la tuberculose est le plus souvent recommandée à partir de 1 mois et jusqu'à l'âge de 15 ans chez les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose.

### Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP)

Les rappels de l'adulte sont recommandés à âges fixes soit 25, 45, 65 ans et ensuite tous les dix ans.

### Coqueluche

Le rappel de l'adulte contre la coqueluche se fait à 25 ans avec rattrapage possible jusqu'à 39 ans. La vaccination contre la coqueluche de la femme enceinte dès le 2<sup>e</sup> trimestre de grossesse est recommandée pour protéger son nourrisson.

### Haemophilus Influenzae de type b (Hib)

Pour les enfants n'ayant pas été vaccinés avant 6 mois, un rattrapage vaccinal peut être effectué jusqu'à l'âge de 5 ans avec le vaccin monovalent (1 à 3 doses selon l'âge).

### Hépatite B

Si la vaccination n'a pas été effectuée au cours de la 1<sup>re</sup> année de vie, elle peut être réalisée jusqu'à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d'hépatite B.

### Pneumocoque

Cette vaccination est obligatoire chez tous les nourrissons et est recommandée aux personnes de 65 ans et plus.

### Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR)

Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses de vaccin.

### Méningocoques ACWY

La vaccination est obligatoire chez tous les nourrissons depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2025 avec une dose à 6 mois suivie d'un rappel à 12 mois. Elle est également recommandée chez les adolescents entre 11 et 14 ans.

### Méningocoque B

Depuis janvier 2025, cette vaccination est obligatoire chez tous les nourrissons à 3, 5 et 12 mois.

### Rotavirus

Recommandé à tous les nourrissons à partir de 2 mois. Deux à trois doses (par voie orale) sont nécessaires selon le vaccin.

### Papillomavirus humain (HPV)

La vaccination est recommandée chez les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 19 ans inclus. De plus, la vaccination est recommandée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à l'âge de 26 ans.

### Grippe

La vaccination est recommandée, chaque année, notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques dont les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et les per-

sonnes souffrant d'obésité (IMC > 40 kg m<sup>2</sup>). La vaccination contre la grippe peut aussi être proposée à tous les enfants de 2 à 17 ans.

### Covid-19

En automne, en plus des personnes à risque ciblée par la grippe, cette vaccination est aussi recommandée aux personnes atteintes de troubles psychiatriques, de démence ou de trisomie 21.

Au printemps, la vaccination est recommandée pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents d'EHPAD et USLD, et les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge.

### Zona

La vaccination est recommandée chez les personnes de 65 ans et plus.

### VRS

La vaccination est recommandée aux personnes de 75 ans et plus aux personnes de 65 ans ayant des infections respiratoires chroniques.

Pour en savoir plus

VACCINATION  
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

Mise à jour : mars 2025  
DT07-016-25PC



\* vaccin fièvre jaune : Recommandation HSCP 2014 en Guyane administration d'une seconde dose de vaccin est recommandée pour les femmes primo-vaccinées en cours de grossesse.